



DLG's anbefalinger til Planteværn 2025




Vårbyg 2			
Behandlings-tidspunkt	Problem	Løsning	Bemærkning
Før fremspiring	Agerstedmoder, fuglegræs, kamille og ærenpris.	0,1-0,15 l DFF	Bedste effekt af DFF. Har desuden dæmpende effekt på andre arter som f.eks. enårig rapgræs.
St. 13-25	Alm. Frøukrudt	0,25 l Pixxaro EC + 2,5 g Nuance Max 75 WG + 0,2 l Contact*	* Der kan tilsættes 0,05 l DFF, hvis DFF ikke er brugt tidligere. DFF må kun bruges 1 gang og senest i st. 28. Følg doserings-trappen på henholdsvis Starane 333 HL, Hussar Plus OD og Pixxaro jvf. etiketterne
		0,5 l Zypar*	
		5 g Nuance Max 75 WG + 0,15 l Starane 333 HL + 0,2 l Contact*	
St. 13-(28*)-30	Alm. Frøukrudt samt græsukrudt	0,07 l Hussar OD Plus + 0,2 l Pixxaro + 0,5 l Penol 33E*	
St. 14-30	Flyvehavre, agerrævehale	0,8-1,0 l Foxtrot + 0,2 l Contact	
St. 21-(28*)-32	Alm. Frøukrudt inkl. Rodukrudt	0,5-0,75 l Mustang Forte*	Vær obs på efterfølgende afgrøde og halmanvendelse
St. 20-39	Tidsler mv	0,75 l U46 M + 0,5 l Zypar	
April/maj	Manganmangel	1,0-2,0 l Profi Mangan NO ₃	Behandling gentages efter behov
Maj/juni	Mikronæringsstoffer	1,0-2,0 l Profi Universal	Behandling gentages efter behov
St. 31-32	Vækstregulering Stråstyrke	0,2-0,4 l Sonis <i>eller</i> 0,5-0,7 l Terpal	
St. 30-32	Svampesygdomme	0,25 l Proline Xpert EC 240	
St. 39-49	Aks- og strånedknækning	0,2-0,3 l Cerone	Laureate, RGT Planet og "Carlsberg" sorter samt arealer, der skal stå længst.
St. 39-59	Svampesygdomme	0,5 l Propulse SE 250 + 0,2 l Comet Pro	Tidlig behandling ved angreb af Ramularia. 0,2 l Comet Pro kan erstattes af 0,2 l Orius Gold
Maj/juni	Bladlus, kornbladbillens larve mv.	0,2 kg Lamdex	
Læs altid etiketten før brug!			

For ukrudtsbekæmpelse i vårbyg med græs- og kløverudlæg
se venligst næste side

Vårbyg m. græsudlæg			2A
Før fremspiring	Agerstedmoder, fuglegræs, kamille og ærenpris.	0,1-0,15 l DFF*	* DFF kan bruges ved udlæg af alm. rajgræs, rødsvingel, bakkesvingel, strandsvingel og hundegræs.
St. 21-(28*) -32	Alm. Frøukrudt	0,5-0,75 l Mustang Forte*	Vær obs på efterfølgende afgrøde + halmanvendelse * Der kan tilsættes 0,05 l DFF, hvis DFF ikke er brugt tidligere. DFF må kun bruges 1 gang og senest i st. 28.
		5 g Nuance Max 75 WG + 0,15 l Starane 333 HL + 0,2 l Contact*	Følg doserings-trappen på Starane 333 HL jvf. etiketten
Vårbyg m. udlæg af bælgssæd og kløvergræs 2B			
St. 12-14 Bælgplanter udviklet 1. løvblad	Alm. Frøukrudt	0,67 kg Basagran SG + 0,5 l Penol 33E	Bedste effekt ved min. 12 °C

Havre			3
Behandlings-tidspunkt	Problem	Løsning	Bemærkning
St. 13-25	Alm. Frøukrudt	5-8 g Nuance Max 75 WG + 0,15 l Starane 333 HL + 0,2 l Contact	Følg doserings-trappen på Starane 333 HL jvf. etiketten
St. 21-32	Alm. Frøukrudt inkl. Rodukrudt	0,5-0,75 l Mustang Forte	Læs etikette for forbehold for efterfølgende afgrøde og halmanvendelse
April/maj	Manganmangel	1,0-2,0 l Profi Mangan NO ₃	Behandling gentages efter behov
St. 20-39	Tidsler mv	1,0 l U46 M + 2,0 l Kvikup	
Maj/juni	Mikronæringsstoffer	1,0-2,0 l Profi Universal	Behandling gentages efter behov
St. 30-34	Vækstregulering	0,2-0,3 l Sonis eller 0,5-0,75 l Medax Top + 0,25-0,375 Kvikup	
St. 30-35	Svampesygdomme	0-0,4 l Proline Xpert EC 240	Pas på meldug!
St. 39-59	Svampesygdomme	0,3 l Propulse SE 250 + 0,2 l Comet Pro	0,2 l Comet Pro kan erstattes af 0,2 l Orius Gold
Maj/juni	Bladlus, kornbladbillens larve mv.	0,2 kg Lamdex	

Vårhvede 4			
Behandlings-tidspunkt	Problem	Løsning	Bemærkning
Før fremspiring	Agerstedmoder, fuglegræs, kamille og ærenpris.	0,1-0,15 l DFF	Bedste effekt af DFF. Har desuden dæmpende effekt på andre arter som f.eks. enårig rapgræs.
St. 13-25	Alm. Frøukrudt	0,25 l Pixxaro EC + 2,5 g Nuance Max 75 WG + 0,2 l Contact*	* Der kan tilsættes 0,05 l DFF, hvis DFF ikke er brugt tidligere. DFF må kun bruges 1 gang og senest i st. 28.
		0,5 l Zypar*	
		5 g Nuance Max 75 WG + 0,15 l Starane 333 HL + 0,2 l Contact*	Følg doserings-trappen på Starane 333 HL jvf. Etiketten.
St. 21-(28*)-32	Alm. Frøukrudt inkl. Rodukrudt	0,5-0,75 l Mustang Forte*	Læs etikette for forbehold for efterfølgende afgrøde og halmanvendelse
St. 20-32	Alm. Frøukrudt samt græsukrudt	100-145 g Broadway + 0,5 l PG26N eller 25-40 g Rexade 440 + 0,5 l PG26N	Rexade 440 har en forbedret effekt på storkenæb og lægejordrøg.
April/maj	Manganmangel	1,0-2,0 l Profi Mangan NO ₃	Behandling gentages efter behov
St. 14-30	Flyvehavre agerrævehale	0,8-1,0 l Foxtrot + 0,2 l Contact	Eller 0,3-0,4 l Topik EC + 0,5 l Penol 33E pr. ha
Medio maj	Bygfluer	0,2 kg Lamdex	2-3 behandlinger med 10-12 dages mellemrum kan være aktuel.
Maj/juni	Mikronæringsstoffer	1,0-2,0 l Profi Universal	Behandling gentages efter behov
St. 30-37	Vækstregulering	0,2-0,4 l Sonis eller 0,5-0,75 l Medax Top + 0,25-0,375 Kvikup	
St. 30-35	Svampesygdomme	0,15 l Orius Gold + 0,25 l Proline Xpert EC 240	
St. 39-59	Svampesygdomme	0,5 l Propulse SE 250 + 0,2 l Comet Pro	
St. 43-61	Orangegule galmyg	0,15 l Mavrik	
Maj/juni	Bladlus, kornbladbillens larve mv.	0,2 kg Lamdex	



Vinterhvede

5

Behandlings- tidspunkt	Problem	Løsning	Bemærkning
Efterår			
St. 10-11	Standardløsning inkl. Raps, valmue, korn- blomst og storkenæb	0,75-1,25 l Boxer + 0,35-0,5 l Mateno Duo 600 SC	
St. 10-11 + St. 12-13	Som ovenstående inkl. agerrævehale og rajgræs	0,75-1,25 l Boxer + 0,7 l Mateno Duo 600 SC ----- 0,2 l Topik + 0,5 l Penol 33E	
September/ oktober	Manganmangel	1,0-2,0 l Profi Mangan NO ₃	Behandling gentages efter behov.
Oktober	Bladlus	0,2 kg Lamdex	Må bruges i st. 9-13. Derefter bruges der 0,1 kg Kaiso Sorbie.
Forår			
Marts/april	Opfølgning på græs- og tokimbladet ukrudt	110-130 g Broadway + 0,45 l Atlantis OD + 0,5 l PG26N	Højeste dosis, hvis ubehandlet efterår. Broadway kan erstatte med 32-37 g Rexade 440, der giver en forbedret effekt på bl.a. hejrenæb, kornblomst, storkenæb, valmue og resistent fuglegræs.
		0,7-0,9 l Cossack OD + 0,5 l Penol 33E + 2 l Kvikup	Mod rajgræs. Kvikup eller anden fl. kvælstof øger effekten. Max 5-10 kgN
	Manganmangel	1,0-2,0 l Profi Mangan NO ₃	Behandling gentages efter behov
St. 30	Vækstregulering	0,2 l Sonis + 0,5 l Trece 750	
April	Opfølgning tokimbladet ukrudt	0,5-1,0 l Zypar	Zypar kan også bruges, hvor der er græsudlæg.
Senest st. 39	Flyvehavre, agerrævehale m.fl.	0,3-0,4 l Topik + 0,5 l Penol 33E	
April/Maj	Mikronæringsstoffer	1,0-2,0 l Profi Universal	Behandling gentages efter behov
St. 30-32	Svampesygdomme	0,4 l Proline Xpert EC 240	Gulrust- og DTR-løsning
		0,2 l Talius + 0,15-0,2 l Orius Gold	Meldug-løsning. Husk at tage højde for triazolregler.
St. 35-39	Vækstregulering	0,5-0,75 l Medax Top + 0,25-0,37 l KvikUp	Eller 0,2 l Sonis + 0,4 l Cerone
Maj	Burresnerre, pileurt mv.	0,2-0,3 l Starane 333 HL	
St. 37-40	Svampesygdomme	0,5-1,0 l Balaya	
St. 43-61	Orangegule galmyg	0,15 l Mavrik	Champion og Heerup er resistente.
St. 51-59	Svampesygdomme	0,5 l Propulse SE 250 + 0,2 l Comet Pro	
Juni	Bladlus mv.	0,2 kg Lamdex	

Vinterbyg 6			
Behandlings-tidspunkt	Problem	Løsning	Bemærkning
Efterår			
St. 0 + St. 10-11	Standardløsning inkl. Raps, valmue, kornblomst og storkenæb	0,75 – 1,25 l Boxer ----- 0,35 l Mateno Duo 600 SC	I vinterbyg må Boxer og Mateno Duo IKKE blandes sammen.
St. 0 + St. 10-11 + 12-13	Som ovenstående inkl. agerrævehale	2,0 l Boxer ----- 0,35 l Mateno Duo 600 SC -----	
		1,0 l Foxtrot + 0,2 l Contact	
September/ oktober	Manganmangel	1,0-2,0 l Profi Mangan NO ₃	Behandling gentages efter behov
Oktober/ november	Bladlus	0,2 kg Lamdex	Må bruges i st. 9-13. Derefter bruges der 0,1 kg Kaiso Sorbie.
Forår			
Marts/april	Opfølgning på græs- og tokimbladet ukrudt	0,05 l Hussar Plus OD + 0,2 Pixxaro + 0,5 l Penol 33E	Har begrænset effekt på enårig rapgræs, vindaks og rajgræs.
	Manganmangel	1,0-2,0 l Profi Mangan NO ₃	Husk, at vinterbyg er mere følsom for manganmangel end andre afgrøder. Behandling gentages efter behov
	Opfølgning frøukrudt	0,5-1,0 l Zypar	
April/Maj	Mikronæringsstoffer	1,0-2,0 l Profi Universal	Behandling gentages efter behov
Senest st. 30	Flyvehavre, agerrævehale m.fl.	0,8-1,0 l Foxtrot + 0,2 l Contact	
St. 30-32	Svampesygdomme	0,25 l Proline Xpert EC 240	
St. 31-32	Vækstregulering/ stråstyrke	0,3-0,4 l Sonis eller 0,5-1,2 l Terpal	
Maj	Burresnerre, pileurt mv.	0,2-0,3 l Starane 333 HL	
St. 39-49	Aks- og strånedknækning	0,3-0,5 l Cerone	
Maj/juni	Bladlus, kornbladbillens larve mv.	0,2 kg Lamdex	
St. 39-59	Svampesygdomme	0,5 l Propulse SE 250 + 0,2 l Comet Pro	Tidlig behandling ved angreb af Ramularia. 0,2 l Comet Pro kan erstattes af 0,2 l Orius Gold

Rengøring af marksprøjten
0,5 l All Clear Extra pr 100 l vaskevand

Vinterrug 7			
Behandlings-tidspunkt	Problem	Løsning	Bemærkning
Efterår			
St. 0 + St. 10-11	Standardløsning inkl. Raps, valmue, korn- blomst og storkenæb	0,75 – 1,25 l Boxer ----- 0,35 l Mateno Duo 600 SC	I vinterrug må Boxer og Mateno Duo IKKE blandes sammen.
St. 0 + St. 10-11 + 12-13	Som ovenstående inkl. agerrævehale og rajgræs	1,5 l Boxer ----- 0,35 l Mateno Duo 600 SC ----- 0,2 l Topik EC + 0,5 l Penol 33E	
September/ oktober	Manganmangel	1,0-2,0 l Profi Mangan NO ₃	
Oktober	Bladlus	0,2 kg Lamdex	Må bruges i st. 9-13. Derefter bruges der 0,1 kg Kaiso Sorbie.
Forår			
Marts/april	Opfølgning græs- og tokimbladet ukrudt	110-130 g Broadway + 0,45 l Atlantis OD + 0,5 l PG26N	Højeste dosis, hvis ubehandlet efterår. Broadway kan erstattes med 32-37 g Rexade 440, der giver en forbedret effekt på bl.a. hejrenæb, kornblomst, storkenæb, valmue og resistent fuglegræs.
		0,6 l Cossack OD + 0,5 l Penol 33E	Mod rajgræs.
	Manganmangel	1,0-2,0 l Profi Mangan NO ₃	Behandling gentages efter behov
St. 30	Vækstregulering	0,2 l Sonis + 0,5 l Trece 750	
April	Opfølgning tokimbladet ukrudt	0,5-1,0 l Zypar	
St. 30-32	Svampesygdomme	0-0,4 l Proline Xpert EC 240	
April/Maj	Mikronæringsstoffer	1,0-2,0 l Profi Universal	Behandling gentages efter behov
Maj	Burresnerre, pileurt mv.	0,2-0,3 l Starane 333 HL	
St. 33-37	Vækstregulering	0,2 l Sonis + 0,4 l Cerone	
St. 45	Trips	0,2 kg Lamdex	Skadestærskel 1 trips pr. bladskede.
St. 39-59	Svampesygdomme	0,3 Proline Xpert EC 240 + 0,3 Comet Pro	
St. 65	Sent angreb af brunrust	0,4 l Orius Gold	

Triticale

8

Behandlings-tidspunkt	Problem	Løsning	Bemærkning
Efterår			
St. 10-11	Standardløsning inkl. Raps, valmue, kornblomst og storkenæb	0,75-1,25 l Boxer + 0,35-0,5 l Mateno Duo 600 SC	
St. 10-11 + St. 12-13	Som ovenstående inkl. agerrævehale og rajgræs	0,75-1,25 l Boxer + 0,7 l Mateno Duo 600 SC ----- 0,2 l Topik + 0,5 l Penol 33E	
September/ oktober	Manganmangel	1,0-2,0 l Profi Mangan NO ₃	Behandling gentages efter behov
Oktober	Bladlus	0,2 kg Lamdex	Må bruges i st. 9-13. Derefter bruges der 0,1 kg Kaiso Sorbie.
Forår			
Marts/april	Opfølgning græs- og tokimbladet ukrudt	110-130 g Broadway + 0,45 l Atlantis OD + 0,5 l PG26N	Højeste dosis, hvis ubehandlet efterår. Broadway kan erstattes med 32-37 g Rexade 440, der giver en forbedret effekt på bl.a. hejrenæb, kornblomst, storkenæb, valmue og resistent fuglegræs.
		0,7-0,9 l Cossack OD + 0,5 l Penol 33E	Mod rajgræs.
	Manganmangel	1,0-2,0 l Profi Mangan NO ₃	Behandling gentages efter behov
St. 30	Vækstregulering	0,2 l Sonis + 0,5 l Trece 750	
April	Opfølgning tokimbladet ukrudt	0,5-1,0 l Zypar	Zypar kan også bruges, hvor der er græsudlæg.
Senest st. 39	Flyvehavre, agerrævehale m.fl.	0,3-0,4 l Topik + 0,5 l Penol 33E	
April/Maj	Mikronæringsstoffer	1,0-2,0 l Profi Universal	Behandling gentages efter behov
St. 30-33	Svampesygdomme	0,2 l Orius Gold + 0,2 l Comet Pro	Mod gulrust
St. 35-39	Vækstregulering	0,5-0,75 l Medax Top + 0,25-0,37 l KvikUp	
Maj	Burresnerre, pileurt mv.	0,2-0,3 l Starane 333 HL	
St. 37-39	Svampesygdomme	0,5 l Propulse SE 250 + 0,2 l Comet Pro	
St. 51-59	Svampesygdomme	0,4 l Proline Xpert EC 240 + 0,3 l Orius Gold	
Juni	Bladlus mv.	0,2 kg Lamdex	


Vinterraps 9			
Behandlings-tidspunkt	Problem	Løsning	Bemærkning
Efterår			
St. 00	Enårig rapgræs, fuglegræs, hyrdetaske mv.	0,2-0,25 l Clomate	Senest 3 dage efter såning
St. 00-15	Rapsjordlopper	0,2 kg Lamdex	Bortgrav af max 10 % bladareal. Max 3 gange/sæson
St. 13	Storkenæb, hejrenæb, burresnerre, kamille mv	1. sprøjtning: 0,25 l Belkar 2. sprøjtning: 0,25 l Belkar	1. spr. rapsen ca. 2-4 blade. 2. spr. 3 uger efter
St. 16	Burresnerre, kamille, hyrdetaske, valmue mv	0,4-0,5 l Belkar	Rapsen min. 6 blade
Spildkorn 2-3 blade	Spildkorn	0,35-0,74 l Agil 100 EC + 0,2 l Contact	Max 2 x 0,37 l hvis splitsprøjtning
Spildkorn 2-3 blade	Spildkorn, rajgræs	0,70-1,5 l Focus Ultra + 0,5 l DASH	Max 2 x 1 l hvis splitsprøjtning
September/oktober	Mikronæringsstoffer/ Biostimulenter	1-2 l Profi Universal	Behandling gentages efter behov
		5-10 kg EPSO MicroTop	
		333 g BLUE N	Tjek blandingsmuligheder
St. 13-15	Vækstregulering	0,5-0,7 l Caryx	
Oktober	Rapsjordloppers larve	0,1 kg Kaiso Sorbie	Max 1 gang pr. sæson
November og december	Spildkorn, græsukrudt, resistent græsukrudt	1,0-1,25 l Kerb 400 SC	
Forår			
Marts/April	Vækstregulering	0,5-0,7 l Caryx	
Marts/April	Lys bladplet	0,4 l Folicur Xpert EC 240	Ved over 20 % angrebne planter
Marts/April Senest st. 50	Kamille, Burresnerre, Valmue, Storkenæb	0,65 l Korvetto	> 10 grader C
Marts/April	Mikronæringsstoffer/ Bormangel/ Biostimulanter	333 g BLUE N	Tjek blandingsmuligheder
April		1,0-2,0 l Profi Universal	Behandling gentages efter behov
April		1,0-2,0 l Profi Bor 150	
April/maj	Bladribbesnudebiller	0,15 kg Kaiso Sorbie	Max 1 behandling pr. sæson
St. 30-59	Glimmerbøsser	0,2 l Mavrik	
	Skulpesnudebiller og galmyg	0,3 kg Lamdex	Max 3 behandlinger pr. sæson
Maj, st. 65, Første gule kronblad falder	Svampesygdomme	0,35 l Pictor Active + 0,35 l Propulse SE 250 + 0,2 l Contact	Eller 0,7 Propulse SE 250 eller 0,7 l Pictor Active + 0,2 l Contact
Maj, st. 69	Svampesygdomme	0,5 l Pictor Active + 0,2 l Contact	Evt. opfølgende svampebekæmpelse 14. dage senere



Hestebønner				10
Behandlings-tidspunkt	Problem	Løsning	Bemærkning	
St. 00	Frøukrudt	0,75-1,0 I Glyphomax 480 HL + 1,0-1,5 I Fenix + 2-4 I Kvikup + 0,2 I Contact	FØR fremspiring. Kan blandes med Clomate. Fenix + Clomate kan erstattes af 1,2-1,8 kg Novitron Dam Tec.	
		0,2-0,25 I Clomate	Senest 3 dage efter såning.	
	Bladrandbiller	0,2 kg Lamdex <i>eller</i> 0,15 I Mavrik	Skadetærskel er 1 gnav pr plante til planterne er 10 cm	
St. 10-12 Ukrudt på kimbladsstadie	Frøukrudt	0,6 kg Basagran SG + 1,0 I Stomp CS	Stomp CS har en mindre godkendelse i hestebønner	
Græs 2-4 blade, kvik 3-4 blade	Enårige græsser, kvik	0,8-2,0 I Focus Ultra + 0,5 I DASH	Højeste dosering mod kvik	
	Manganmangel	1,0-2,0 I Profi Mangan NO ₃	Behandling gentages efter behov	
St. 60-69	Svampesygdomme Bladplet Chokoladeplet Vikkeskimmel	1. 0,4-0,5 I Pictor Active + 0,2 I Contact	1. sprøjtning medio juni ca. 10 dage efter begyndende blomst	
		2. 0,4-0,5 I Pictor Active + 0,2 I Contact	2. sprøjtning 2 uger senere	
	Bladlus	0,25 kg Pirimor 500 WG	Max 1 behandling	

Ærter				
St. 00	Frøukrudt	0,2-0,25 I Centium 36 CS	Før fremspiring: 1,2-2,4 kg Novitron Dam Tec (blanding af Fenix og Centium 36 CS)	
Ukrudt på kimbladsstadie 1. sprøjtning	Frøukrudt	0,2 kg Basagran SG + 0,5 I Stomp CS + 0,5 I Penol 33E	Eller der kan vælges at køre med 0,6 kg Basagran SG pr. ha én gang.	
2. sprøjtning 7-14 dage senere		0,3 kg Basagran SG + 0,5 I Stomp CS + 0,5 I Penol 33E	Løsningen kan også bruges når der er udlæg af rødsvingel eller engrapgræs	
	Bladrandbiller	0,2 kg Lamdex <i>eller</i> 0,15 I Mavrik	Skadetærskel er 1 gnav pr plante til planterne er 10 cm	
Græs 2-4 blade, kvik 3-4 blade	Græsser, kvik	0,8-2,0 I Focus Ultra + 0,5 I DASH	Højeste dosering mod kvik	
St. 51-60	Svampesygdomme	0,5-0,6 I Mirador 250 SC		
	Ærtevikler	0,2 I Mavrik <i>eller</i> 0,3 kg Lamdex	Når skadetærsklen er overskredet efter fangst i feromonfælder. Begge midler har også effekt på bladlus.	
	Bladlus	0,25 kg Pirimor 500 WG	Max 1 behandling	

Majs 11			
Behandlings-tidspunkt	Problem	Løsning	Bemærkning
St. 00	Ukrudt	0,75-1 l Glyphomax 480 HL + 2-4 l Kvikup + 0,2 l Contact	FØR majsens fremspiring! Laveste DFF-dos. på sandjord. DFF kun i fodermajs
St. 00	Ærenpris m.fl.	0,05-0,075 l DFF	
Når majsen har 1½-2 blade	Fritfluer	0,4 kg Lamdex	
1. bladsprøjtning 10-12 dage efter såning Ukrudt max 2 løvblade	Frøukrudt inkl. Græsser	Løsning A 50 g MaisTer + 0,67 l MaisOil + 0,5 l Starship Max + 0,15 l Starane 333 HL	Standardbehandling
		Løsning B 0,5 l Onyx + 0,5 l Starship Max + 5,6 g Harmony 50 SX + 0,15 l Contact	Bredspektret løsning mod bl.a. pileurter, ærenpris, hanespore, burresnerre og storkenæb. Hvis denne løsning vælges, kan man undvære DFF sprøjtningen.
2. bladsprøjtning Nyfremspirret ukrudt, Ca. 10 dage efter 1. sprøjtning.	Frøukrudt inkl. Græsser	50-100 g MaisTer + 0,67-1,33 l MaisOil + 0,5 l Starship Max	Højeste MaisTer-dosering ved kvik, tidsler og grå bynke. Maister max 150 g pr. ha. pr år Starship Max max 1,5 pr. Ha pr år og max 2 behandlinger.
3. bladsprøjtning Ca. 10-14 dage efter 2. sprøjtning.	Hanespore, grøn skærmaks og andre græsser	0,1 kg Evolya + 75 g MaisTer + 0,5 l Onyx 1,0 l MaisOil	Hvis denne behandling er nødvendig, så vælges løsning B i 1. sprøjtning og max 75 g Maister i 2. sprøjtning.
St. 14-63 Majs 4 -8 blade	Mikronæringsstoffer	1-2 l Profi Universal + eller 1,0 l Profi Mangan NO ₃ + 1,0 l Profi Bor 150*	Anvendes 1-2 gange på afgrødens 3-4 bladstadie. *Tilsæt NovaBalance først og så mangan. Efter grundig omrøring tilsættes bor til sidst.
		10 kg EPSO Microtop	
St. 32-69	Majsøjeplet Majsbladplet	0,4 l Propulse SE 250 + 0,2 l Comet Pro	Ved > 10% angreb. Størst risiko ved reduceret jordbehandling
Læs altid etiketten før brug!			



Kartofler 12			
Behandlings-tidspunkt	Problem	Løsning	Bemærkning
April	Bejdsning (Rodfiltsvamp)	0,313 l/ha Maxim 100 FS + 1 l Serenade Soil Activ	Dosering ved udsædsmængde på 2,5 tons/ha. På lægger: 70-100 l vand/ha. Rullebordsbejdsning: blandes i forholdet 1:1 med vand. 0,625 l/ha Maxim 100 FS uden blanding med Serenade Soil Activ
		0,375 l Rizolex 50 FW + 0,05 l RizoPlus 1 l Serenade Soil Activ	På lægger: 75-100 l vand. Blandes der ikke med Serenade Soil Activ bruges 0,75 l Rizolex 50 FW + 0,05 l RizoPlus
1. St. 00 Ukrudt inden fremspiring 2. St. 00-09 Lige før fremspiring		1. (1,5 l Glyphomax 480 HL + 2-4 l Kvikup + 0,2 l Contact) + 0,25 l Centium 36 CS + 2. 1,5-2,0 l Proman + 0,25 l Fenix	I lægge- og spisekartofler må der ikke bruges Glyphomax 480 HL. Her bruges den høje dosis af Proman.
Bladsprøjtning efter fremspiring	Frøukrudt	0,25 l Fenix	Ca. 7-10 dage efter sidste ukrudts- sprøjtning. Ikke i læggekartofler.
Græs 2-4 blade, kvik 3-4 blade	Enårige græsser, kvik	1,0-2,0 l Focus Ultra + 0,5 l DASH	Max 1 behandling. Højeste dosis mod kvik
Maj/juni	Tæger og bladlus	0,3 kg Lamdex	Evt. randbehandling begyndende angreb
	Bladlus	0,16 kg Teppeki	Ved begyndende angreb
	Cikader	0,15-0,25 kg Mospilan SG	2-4 uger efter begyndende indflyvning
	Coloradobiller	0,06 kg Mospilan SG	Ved begyndende angreb, max 2 behandlinger pr. sæson
	Knoporme	0,4 kg Lamdex	Ved begyndende angreb
St. 20-69	Mikronærings- stoffer	1-2 l Profi Mangan NO ₃	2-3 gange i st. 14-20
		5 x 5 kg EPSO MicroTop	I ca. hver anden skimmelsprøjtning
Juni	Kartoffel- skimmel	1: 0,4 l Shirlan Ultra + 0,45 l Revus	
		2: 0,4 l Shirlan Ultra + 1,1 l Sporax + 0,2 l Option WG	
		3: 0,15 l Zorvec Enicade + 1,4 l Sporax	
		4: 0,4 l Shirlan Ultra + 0,2 l Option WG	
Juli		5: 0,15 l Zorvec Enicade + 1,4 l Sporax + 0,2 l Option WG	
	+ kartoffelbladplet	6: 0,4 l Shirlan Ultra + 0,5 Mirador + 0,4 l Narita	
		7: 0,45 l Revus + 1,1 l Sporax	
	+ kartoffelbladplet	8: 0,4 l Shirlan Ultra + 0,2 l Option WG + 0,45 l Propulse SE 250	
August		9: 0,45 l Revus + 1,1 l Sporax	
	+ kartoffelbladplet	10: 0,4 l Shirlan Ultra + 0,2 l Option WG + 0,4 l Narita	
		11: 0,6 l Revus + 0,2 l Option WG + 0,5 l Mirador	
	+ kartoffelbladplet	12: 0,4 l Shirlan Ultra + 0,2 l Option WG + 0,45 l Propulse SE 250	
September		13: 0,6 l Revus + 0,4 l Shirlan Ultra	
		14: 0,4 l Shirlan Ultra + 0,2 l Option WG	
St. 90-95	Nedvisning	Stivelse- og spisekartofler Aftopning + 2 x 1 l eller 1 x 2 l Mizuki Certificeret Læggekartofler 1-2 x 2,0 l Mizuki	

Roer		13	
Behandlings-tidspunkt	Problem	Løsning	Bemærkning
St. 00 Senest 3 dage før fremspiring	Hundepersille, m. fl	0,075-0,125 l Clomate	Laveste dosering på JB 1-3
Efter fremspiring	Bedefluens larve, jordlopper, trips og (runkelroebiller)	0,2 kg Lamdex	Undgå plansprøjtning!
St. 10 1. sprøjtning Ukrudt på kimbladstadiet	Tokimbladet ukrudt	1,5 l Betanal + 1,0 l Metafol 700 SE + 0,1 l Nortron SC + 0,5 l Penol 33E	Ukrudt kimblade. Metafol giver den bedste effekt mod "melder"
St. 11 2. sprøjtning 5-8 dage senere end 1. sprøjtning	Tokimbladet ukrudt	1,5 l Betanal + 0,75 l Metafol 700 SE + 0,15 l Nortron SC + 0,5 l Penol 33E	Nortron SC max 3 x 0,23 l pr ha. Nortron er god mod snerlepileurt.
St. 13-14 3. sprøjtning 10-14 dage senere end 2. sprøjtning	Tokimbladet ukrudt	1,5 l Betanal + 0,75 l Metafol 700 SE + 0,15 l Nortron SC + 0,05-0,075 l Centium 36 CS + 1-2 l Megafol 0,5 l Penol 33E	Brug af Centium 36 CS kræver, at roerne har mindst 2 løvblade. Tilsætning af Megafol nedsætter herbicid stress
St. 15 Eventuelt 4. sprøjtning	Tokimbladet ukrudt	1,5 l Betanal + 0,5 l Metafol 700 SE + 0,5 l Penol 33E	Max 3,0 l Metafol 700 SE Max 6,0 l Betanal
St. 16	Enårige græsser og kvik	0,8-2,0 l Focus Ultra + 0,5 l DASH	Højeste dosis mod kvik
St. 30 Ved rækkelukning	Forebyggelse af mangan- og bormangel	1-2 l Profi Mangan NO ₃ + 1,0 l Profi Bor 150*	*Tilsæt NovaBalance først og så mangan. Efter grundig omrøring tilsættes bor til sidst.
		2 x 10 kg EPSO Microtop	
	Bladlus	0,28 kg Pirimor 500 WG eller 0,14 kg Teppeki	Ved eventuelt angreb
Juli/august	Svampesygdomme	0,4 l Comet Pro	Senest ved beg. angreb. 5,0 l Thiopron er god mod meldug og kan anvendes i meldug- modtagelige sorter.
August/september	Svampesygdomme	0,2 l Comet Pro + 0,3 l Amistar Gold	Ca. 3 uger efter første behandling. Skal der i svampebehandles 3 gange bruges der 3. gang 0,4 l Amistar Gold. Der er søgt om godkendelse af Propulse SE 250 i sukker- roer. I givet fald tilsættes 0,55 l Propulse SE 250 1. og 2. sprøjtning og Amistar Gold undlades.

Læs altid etiketten før brug!

Glyphosat

14

Behandlings-tidspunkt	Løsning	Bemærkning
Generelt	Glyphosat må kun anvendes <u>én gang</u> pr vækstsæson. Anvendes før såning og efter såning <u>før</u> fremspiring. Må ikke anvendes <u>efter</u> fremspiring i konsum og foderafgrøder. I foderafgrøder må der laves en <u>pletsprøjtning</u> mod flerårigt ukrudt efter fremspiring.	
Før såning i foråret	2,25 - 3,0 l Glyphomax 480 HL + additiv eller 3 - 4 l Glypper Go + additiv	Sprøjtning foretages bedst 3-5 dage inden jordbearbejdningen går i gang. Laveste dosis mod frøukrudt og spildkorn, og største dosis mod væselhale og olieræddike.
Omsåning af korn	0,75-1,5 l Glyphomax 480 HL + additiv eller 1 - 2,0 l Glypper Go + additiv	Omsåning af korn, nyfremspiret ukrudt. Sprøjtning foretages senest 2 dage før såning af efterfølgende afgrøde eller 24 timer før jordbearbejdning.
Før høst	Kun pletsprøjtning mod flerårigt ukrudt i foderafgrøder. Må ikke anvendes i afgrøder til fremavl og konsum (maltbyg, brødkorn, havregryn og konsumærter) Sørg for at anvendelsen af glyphosat før høst kun er ved områder (pletsprøjtning) i marken med kvik, tidsler, rodukrudt. Det er vigtigt, at ukrudtet er grønt på sprøjtetidspunktet. Doseringen afhænger af ukrudtsart og ukrudtsmængde – den største dosering anvendes på store mængder kvik, tidsler og andet rodukrudt.	
Korn	Rodukrudt 1,5 - 2,25 l Glyphomax 480 HL + additiv eller 2,0 - 3,0 l Glypper Go + additiv	En glyphosatsprøjtning i korn skal minimum foretages 10 dage før høst, men det optimale tidspunkt i kornafgrøderne er 2-3 uger før høst, når kernerne vandprocent er kommet ned under 30-35%. På dette tidspunkt er det sidste grønne skær over marken ved at forsvinde, og kernerne er vanskelige at dele med en fingernegl.
Vinterraps	Rodukrudt 2,25 l Glyphomax 480 HL + additiv eller 3,0 l Glypper Go + additiv	
Hestebønner	Rodukrudt 2,25 l Glyphomax 480 HL + additiv eller 2,0 - 4,0 l Glypper Go + additiv	
Ærter til modenhed	Rodukrudt 1,5 - 2,25 l Glyphomax 480 HL + additiv eller 2,0 - 4,0 l Glypper Go + additiv	Behandlingen foretages, når 70-75% af marken har skiftet til gulgrøn til gulbrun. De nederste bælg er brune, de midterste bælg er lysegule og de øverste bælg lysegule/lysegrønne. Ærterne i de øverste bælg er faste og kan flækkes med 2 fingre.
Fortsættes på næste side!		

Rengøring af marksprøjten

0,5 l All Clear Extra pr 100 l vaskevand

Glyphosat

15

Glyphosat		15																
Behandlings- tidspunkt	Løsning	Bemærkning																
I stub	Gå ikke for tidligt i gang med jordbehandlingen. Der bør gå 2 – 14 dage mellem sprøjtning og jordbehandling. Kortest tid hvor det er småt frøukrudt, der skal bekæmpes og længst tid, hvis det er rodukruddt, der skal bekæmpes. Sent på efteråret bør der som minimum gå 10 – 14 dage.																	
Før direkte såning og ved pløjefri dyrkning	1,125 – 1,5 l Glyphomax 480 HL + additiv eller 1,0 - 2,0 l Glypper Go + additiv	Hvis græsukrudtet som væselhale, rajgræs og agerrævehale, har dannet tuer er det vigtigt at anvende en fornuftig dosis glyphosat på op til 1.440 gram svarende til 3,0 l Glyphomax 480 HL pr. ha ved 2 behandlinger. Max dosis antal sprøjtn. 1: 1,5 l, 2: 3,0 l																
Bekæmpelse af kvik	2,25 - 3,0 l Glyphomax 480 HL + additiv eller 3,0 - 4,0 l Glypper Go + additiv	Foretages typisk 3-4 uger efter høst, når kvikken er ca. 20 cm høj og har 3 blade, begynder saftstrømmen igen at bevæge sig ned i udløberne.																
Bekæmpelse af rodukruddt som tidsler, følfod, gråbynke mv.	1,125 - 1,5 l Glyphomax 480 HL + additiv eller 2 l Glypper Go + additiv	Bekæmpelse foretages ca. 3-4 uger efter høst, når der er en passende genvækst. Højeste dosis til tidselbekæmpelse. Nøjes med at plet- eller randbehandle hvor det er muligt!																
Frøgræsstub	3 - 4,5 l Glyphomax 480 HL + additiv eller 2,0 - 6,0 l Glypper Go + additiv	Højeste dosis bruges mod rødsvingel og stivbladet svingel. Især rødsvingel er svær at bekæmpe selv med en høj dosis glyphosat.																
Additiver	Under langt de fleste forhold bør sprøjtevandet tilsættes et eller flere additiver som Kvikup eller NovaBalance inden glyphosaten tilsættes. Tilsætning af et additiv øger effekten, fordi glyphosat er en såkaldt kationbinder. Det betyder, at glyphosatmolekylet villigt binder sig til andre molekyler i vand som f.eks. calcium (hårdt vand), magnesium og jern. Derved bliver glyphosatmolekylet for stort, til at kunne komme ind i planten og gøre nytte.																	
	- Kvikup og NovaBalance forhindrer, at glyphosat binder sig til Ca, Mg eller Fe - Contact har en positiv effekt på gennemtrængningen af vokslaget. Desuden har Contact en hygroskopisk virkning, der holder dråberne fugtige i længere tid, og derved giver aktivstoffet bedre tid til at diffundere ind i planten.																	
Kvikup og NovaBalance tilsættes i forhold til vandets hårdhed	<table><tr><th>Vand hårdhed</th><th>Kvikup</th><th>eller</th><th>NovaBalance</th></tr><tr><td>Blødt vand (< 8 dH)</td><td>1,0 l + 0,2 l</td><td>Contact pr ha</td><td>0,05 l + 0,2 l</td></tr><tr><td>Middelhårdt vand (8-18 dH)</td><td>2,0 l + 0,2 l</td><td>Contact pr ha</td><td>0,10 l + 0,2 l</td></tr><tr><td>Hårdt vand (> 18 dH)</td><td>4,0 l + 0,2 l</td><td>Contact pr ha</td><td>0,20 l + 0,2 l</td></tr></table>		Vand hårdhed	Kvikup	eller	NovaBalance	Blødt vand (< 8 dH)	1,0 l + 0,2 l	Contact pr ha	0,05 l + 0,2 l	Middelhårdt vand (8-18 dH)	2,0 l + 0,2 l	Contact pr ha	0,10 l + 0,2 l	Hårdt vand (> 18 dH)	4,0 l + 0,2 l	Contact pr ha	0,20 l + 0,2 l
Vand hårdhed	Kvikup	eller	NovaBalance															
Blødt vand (< 8 dH)	1,0 l + 0,2 l	Contact pr ha	0,05 l + 0,2 l															
Middelhårdt vand (8-18 dH)	2,0 l + 0,2 l	Contact pr ha	0,10 l + 0,2 l															
Hårdt vand (> 18 dH)	4,0 l + 0,2 l	Contact pr ha	0,20 l + 0,2 l															
Husk	- Glyphosat må kun anvendes én gang pr vækstsæson - Additiverne skal tilsættes sprøjtevandet inden glyphosaten - Behandlingen bør udføres som en morgensprøjtning på saftspændte overvejende tørre planter og med udsigt til høj lysindstråling i løbet af dagen - Vandmængden bør være omkring 100 l vand pr ha og max 150 l vand pr ha, da glyphosat virker bedst i en relativ høj koncentration. - Anvend en kompaktinjektionsdyse for at undgå vinddrift - Pas på markkanten, da bortsprøjtning af markkanten kan give uønsket invasion af blød- og gold hejre, burrener mv. - Glyphosat må kun pletsprøjtes mod flerårigt ukrudt i foderafgrøder - Glyphosat må ikke anvendes i maltbyg, brødkorn og andre konsumafgrøder - Glyphosat må ikke anvendes i fremavlsafgrøder - Glyphosat må ikke anvendes på befæstede arealer og stærkt permeable arealer - Læs altid en eventuel kontrakt på afgrøden, inden den behandles med glyphosat																	



Planteværnsaftale med værdi!

Med en DLG Planteværnsaftale får du altid adgang til de nyeste og godkendte produkter inden for planteværn.

Med en planteværnsaftale får du

- En flexibel aftale for at undgå unødigt lager
- Attraktive betalingsbetingelser
- Landsdækkende lagre med afhentingsmuligheder
- Sprintlevering af suppleringsordre samme dag
- Danmarks bedste rådgivning via vores nyhedsbrev 'Fokus på Marken'
- Gratis fragt af hovedordre
- Altid nyeste produceret produkter med fuld sportbarhed

